經史證類備急本草卷第一

序例上

補注總敘

舊說本草經神農所作而不經見漢書藝文志亦無錄焉平帝紀云元始五年舉天下通知方術本草者在所爲駕一封軺傳遣詣京師樓護傳稱護少誦醫經本草方術數十萬言本草之名蓋見於此而英公李世勣等注引班固敘黃帝內外經云本草石之寒溫原疾病之深淺此乃論經方之語而無本草之名惟梁七録載神農本草三卷推以爲始斯爲失矣或疑其間所載生出郡縣有後漢地名者以爲似張仲景華佗輩所爲是又

不然也淮南子云神農嘗百草之滋味一日而七十毒由是醫方興焉蓋上世未著文字師學相傳謂之本草兩漢以來名醫益衆張機華佗輩始因古學附以新說通爲編述本草繇是見於經錄然舊經才三卷藥止三百六十五種至梁陶隱居又進名醫别錄亦三百六十五種因而注釋分爲七卷唐顯慶中監門衛長史蘇恭又摭其差謬表請刋定乃命司空英國公李世勣等與恭參考得失又增一百一十四種分門部類廣爲二十卷世謂之唐本草

國朝開寶中兩詔醫工劉翰道士馬志等相與撰集又取醫家嘗用有効者一百三十三種而附益之仍命翰

林學士盧多遜李昉王祐扈蒙等重爲刊定乃有詳定重定之目並鏤板摹行由此醫者用藥遂知適從而僞蜀孟昶亦嘗命其學士韓保昇等以唐本圖經參比爲書稍或增廣世謂之蜀本草今亦傳行是書自漢迄今甫千歲其間三經撰著所增藥六百餘種收採彌廣可謂大備而知醫者猶以爲傳行既久後來講求浸多參校近之所用頗亦漏略宜有纂録以備頤生驅疾之用

嘉祐二年八月有

詔臣禹錫臣億臣頌臣洞等再加校正臣等亦既被命遂更研覈竊謂前世醫工原診用藥隨效輒記遂至增多槩見諸書浩博難究雖屢加删定而去取非一或本

經已載而所述粗略或俚俗嘗用而太醫未聞嚮非因事詳著則遺散多矣乃請因其疏捂更爲補注應諸家醫書藥譜所載物品功用並從採掇惟名近迂僻類乎怪誕則所不取自餘經史百家雖非方餌之急其間或有參說藥驗較然可據者亦兼收載務從該洽以副詔意凡名本草者非一家今以開寳重定本爲正其分布卷類經注雜糅間以朱墨並從舊例不復釐改凡補注並據諸書所說其意義與舊文相參者則從删削以避重複其舊已著見而意有未完後書復言亦具存之欲詳而易曉仍每條並以朱書其端云臣等謹按某書云某事其別立條者則解於其末云見某書凡所引書

以唐蜀二本草爲先他書則以所著先後爲次第凡書舊名本草者今所引用但著其所作人名曰某人惟唐蜀本則曰唐本云蜀本云凡字朱墨之別所謂神農本經者以朱字名醫因神農舊條而有增補者以墨字間於朱字餘所增者皆別立條並以墨字凡陶隱居所進者謂之名醫別錄並以其注附於末凡顯慶所增者亦注其末曰唐本先附凡開寶所增者亦注其末曰今附凡今所增補舊經未有者於逐條後開列云新補凡藥舊分上中下三品今之新補難於詳辨但以類附見如綠礬次於礬石山薑花次於豆蔻扶移次於水楊之類是也凡藥有功用本經未見而舊注已曾引據今之所

四·六五

增但涉相類更不立條並附本注之末曰續注如地衣附於垣衣燕覆附於通草馬藻附於海藻之類是也凡舊注出於陶氏者曰陶隱居云出於顯慶者曰唐本注出於開寶者曰今注其開寶考據傳記者別曰今按今詳又按皆以朱字別於其端凡藥名本經已見而功用未備今有所益者亦附於本注之末凡藥有今世已嘗用而諸書未見無所辨證者如葫蘆巴海帶之類則請從太醫衆論參議別立爲條曰新定舊藥九百八十三種新補八十二種附於注者不預焉新定一十七種總新舊一千八十二條皆隨類粗釋推以十五凡則補注之意可見矣舊著開寶英公陶氏三序皆有義例所不

可去仍載於首篇云

新舊藥合一千八十二種

三百六十種神農本經

一百八十二種名醫別録

一百一十四種唐本先附

一百三十三種今附

一百九十四種有名未用

八十二種新補

一十七種新定

本草圖經序

昔神農嘗百草之滋味以捄萬民之疾苦後世師祖由是本草之學興焉漢魏以來名醫相繼傳其書者則有吴普李當之藥録陶隱居蘇恭等注解 國初兩詔近臣總領上醫兼集諸家之說則有開寶重定本草其言藥之良毒性之寒温味之甘苦可謂備且詳矣然而五方物產風氣異宜名類既多贗僞難別以虺牀當蘼蕪以薺苨亂人參古人猶且患之況今醫師所用皆出於市賈市賈所得蓋自山野之人隨時採獲無復究其所從來以此爲療欲其中病不亦遠乎昔唐永徽中删定本草之外復有圖經相輔而行圖以載其形色經以釋其同異而明皇御製又有天寶單方藥圖皆所以叙物

眞濫使人易知原診處方有所依據二書失傳且又散落殆盡雖 鴻都秘府亦無其本夫賫方書但存一卷類例粗見本末可尋宜乎 聖君哲輔留意於蒐輯也

先是 詔命儒臣重校神農本草等凡八書光祿卿直祕閣臣禹錫尚書祠部郎中祕閣校理臣億太常博士集賢校理臣頌殿中丞臣檢光祿寺丞臣保衡相次被選仍領醫官秦宗古朱有章等編繹累年旣而補注本草成書奏御又 詔天下郡縣圖上所產藥本用永徽故事重命編述臣禹錫以謂考正群書資衆見則其功易就論著文事出異手則其體不一今天下所上繪事千名其解說物類皆據世醫之所聞見事有詳略言多

鄙俚向非專壹整比緣飾以文則前後不倫披尋難曉
乃以臣頌嚮嘗刻意此書於是建言 奏請俾專撰述
臣頌既被 旨則裒集衆說類聚詮次粗有條目其間
玉石金土之名草木蟲魚之別有一物而雜出諸郡者
有同名而形類全別者則參用古今之說互相發明其
荄梗之細大華實之榮落雖與舊說相戾並兼存之崖
略不備則稍援舊注以足成文意注又不足乃更旁引
經史及方書小說以條悉其本原若陸英爲蒴藋花則
據爾雅之訓以言之諸香本同則用嶺表錄異以證之
之類是也生出郡縣則以本經爲先今時所宜次之若
菟絲生於朝鮮今則出於冤句奚毒生於少室今乃來

自三蜀之類是也收採時月有不同者亦兩存其說若
赤箭本經但著採根今乃并取莖苗之類是也生於外
夷者則據今傳聞或用書傳所載若玉屑玉泉今人但
云玉出於于闐不究所得之因乃用平居誨行程記爲
質之類是也藥有上中下品皆用本經爲次第其性類
相近而人未的識或出於遠方莫能形似者但於前條
附之若溲疏附於枸杞琥珀附於茯苓之類是也又古
方書所載簡而要者昔人已述其明驗今世亦常用之
及今諸郡醫工所陳經效之藥皆并載其方用天寶之
例也自餘書傳所無今醫又不能解則不敢以臆說淺
見傅會其文故但闕而不錄又有今醫所用而舊經不

載者並以類次系於末卷曰本經外類其間功用尤著
與舊名附近者則次於逐條載之若通脫次於木通石
蚘次於石蠏之類是也總二十卷目録一卷撰次甫就
將備親覽恭惟 主上以至仁厚徳 函養生類一物
失所則 爲之惻然且謂札瘥薦臻四時代有 救恤
之患無先醫術蚤歲屢 敕近臣讎校岐黄内經重定
鍼艾俞穴或範金揭石或鏤板聯編 憫南方蠱惑之
妖於是 作慶曆善救方以賜之恩下民資用之闕於
是 作簡要濟衆方以示之今復 廣藥譜之未備圖
地產之所宜物色萬殊指掌斯見將使合和者得十全
之效飲餌者無未達之疑納斯民於壽康召和氣於穹

壤太平之致茲有助焉臣學不該通職預編述仰奉
宸旨深愧寡聞嘉祐六年九月日朝奉郎太常博士充
集賢校理新差知潁州軍州兼管内勸農及管句開治
溝洫河道事騎都尉借紫臣蘇頌謹上

開寶重定序

三墳之書神農預其一百藥既辨本草存其錄舊經三
卷世所流傳名醫別錄互爲編纂至梁正白先生陶景
乃以別錄參其本經朱墨雜書時謂明白而又考彼功
用爲之注釋列爲七卷南國行焉洎乎有唐別加參校
增藥餘八百味添注爲二十一卷本經漏功則補之陶
氏誤說則證之然而載歷年祀又踰四百朱字墨字無

本得同舊注新注其文互有是非
聖主撫大同之運永無疆之休其何以改而正之哉乃
命盡考傳誤刊爲定本類例非允從而葦焉至如筆頭
灰兎毫也而在草部今移附兎頭骨之下半天河地漿
皆水也亦在草部今移附土石類之間敗鼓皮移附於
獸皮胡桐淚改從於木類紫鑛亦木也自玉石品而取
焉伏翼實禽也由蟲魚部而移焉橘柚附於果實食鹽
附於光鹽生薑乾薑同歸一說至於雞腸蘩蔞英蒴
藋以類相似從而附之仍採陳藏器拾遺李含光音義
或討源於別本或傳效於醫家參而較之辨其臧否至
如突厥白舊說灰類今是木根天麻根解似赤箭今文

全異去非取是特立新條自餘刊正不可悉數下採衆議定爲印板乃以白字爲神農所說墨字爲名醫所傳唐附今附各加顯注詳其解釋審其形性證謬誤而辨之者署爲今注考文記而述之者又爲今按義既刊定理亦詳明今以新舊藥合九百八十三種并目錄二十一卷廣頒天下傳而行焉

唐本序 禮部郎中孔志約撰

蓋聞天地之大德曰生運陰陽以播物含靈之所保曰命資亭育以盡年蟄穴棲巢感物之情蓋寡範金揉木逐欲之道方滋而五味或爽時昧甘辛之節六氣斯沴易愆寒燠之宜中外交侵形神分戰飲食伺釁成腸胃

之眚風濕候隙遘手足之災機（當作幾）纏膚腠莫知救止
漸固膏肓期於夭折暨炎暉紀物識藥石之功雲瑞名
官窮診候之術草木咸得其性鬼神無所遁情刳麝剸
犀驅洩邪惡飛丹鍊石引納清和大庇蒼生普濟黔首
功侔造化恩邁財成日用不知于今是賴岐和彭緩騰
絕軌於前李華張吳振英聲於後昔秦政煨燔茲經不
預永嘉喪亂斯道尚存梁陶景雅好攝生研精藥術以
爲本草經者神農之所作不刊之書也惜其年代浸遠
簡編殘蠹與桐雷衆記頗或踳駮興言撰緝勒成一家
亦以琱琢經方潤色醫業然而時鍾鼎峙聞見闕於殊
方事非僉議詮釋拘於獨學至如重建平之防巳棄槐

里之半夏秋採榆人冬收雲 實謬粱米之黃白混荊子
之牡蔓異繁蔓於雞腸合由跋於鳶尾防葵狼毒妄曰
同根鉤吻黃精引為連類鉛錫莫辨橙柚不分凡此比
例蓋亦多矣自時厥後以迄于今雖方技分鑣名醫繼
軌更相祖述罕能釐正乃復採杜衡於及已求忍冬於
絡石捨陟釐而取莂藤退飛廉而用馬薊承疑行妄曾
無有覺疾瘵多殆良深慨歎既而朝議郎行右監門府
長史騎都尉臣蘇恭摭陶氏之乖違辨俗用之紕紊遂
表請修定深副聖懷乃詔太尉揚州都督監修國史上
柱國趙國公臣無忌太中大夫行尚藥奉御臣許孝崇
等二十二人與蘇恭詳撰竊以動植形生因方舛性春

秋節變感氣殊功離其本土則質同而效異乖於採摘乃物是而時非名實既爽寒溫多謬用之凡庶其欺已甚施之君父逆莫大焉於是上稟神規下詢衆議普頒天下營求藥物羽毛鱗介無遠不臻根莖花實有名咸萃遂乃詳探祕要博綜方術本經雖闕有驗必書別錄雖存無稽必正考其同異擇其去取鉛翰昭章定羣言之得失丹青綺煥備庶物之形容撰本草并圖經目錄等凡成五十四卷臣禹錫等謹按蜀本草序作五十三卷及唐英公進本草表云勒成本草二十卷目錄一卷藥圖二十五卷圖經七卷凡五十三卷又英公序云撰本草并圖經目錄等凡成五十三卷據此三者合作五十三卷又據李含光本草音義云正經二十卷目錄一卷又別立圖二十五卷目錄一卷圖經七卷凡五十四卷二說不同今並注之庶以綱羅今古開滌耳目盡醫方之妙極拯生靈之性命傳萬祀而無昧懸百王而

不朽

梁陶隱居序

隱居先生在乎茅山巖嶺之上以吐納餘暇頗遊意方技覽本草藥性以爲盡聖人之心故撰而論之舊說皆稱神農本經余以爲信然昔神農氏之王天下也畫八卦以通鬼神之情造耕種以省殺生之弊宣藥療疾以拯夭傷之命此三道者歷衆聖而滋彰文王孔子彖象繇辭幽贊人天后稷伊尹播厥百穀惠被群生岐黃彭扁振揚輔導恩流含氣並歲踰三千民到于今賴之但軒轅以前文字未傳如六爻指垂畫象稼穡即事成迹至於藥性所主當以識識相因不爾何由得聞至于桐

雷乃著在於編簡此書應與素問同類但後人多更修飭之爾秦皇所焚醫方卜術不預故猶得全錄而遭漢獻遷徙晉懷奔迸文籍焚靡 臣禹錫等謹按蜀本作靡音糜 千不遺一今之所存有此四卷 臣禹錫等謹按唐本亦作四卷韓保昇又云神農本草上中下并序錄合四卷今按四字當作三傳寫之誤也何則按梁七錄云神農本草三卷又據今本經陶序朱書云本草經卷上卷中卷下卷上注云序藥性之源本論病名之形診卷中云玉石草木三品卷下云蟲獸果菜米食三品即不云三卷外別有序錄明知韓保昇所云承據誤本妄生曲說今當從三卷為正 是其本經所出郡縣乃後漢時制疑仲景元化等所記又有桐君採藥錄說其花葉形色藥對四卷論其佐使相須魏晉已來吳普 臣禹錫等謹按蜀本注云普廣陵人也華佗弟子撰本草一卷 李當之 臣禹錫等謹按蜀本注云華佗弟子修神農舊經而世少行用 等更復損益或五百九十五或四百四十一或三百一十九或三品混糅冷熱舛錯草石不分蟲獸無

辨其所主治互有得失醫家不能備見則識智有淺深今輒苞綜諸經研括煩省以神農本經三品合三百六十五爲主又進名醫副品亦三百六十五合七百三十種精麤皆取無復遺落分別科條區畛（音軫）物類兼注詺（音[illegible]）時用土地所出及仙經道術所須并此序録合爲七卷雖未足追踵前良蓋亦一家撰製吾去世之後可貽諸知音爾

本草經卷上（序藥性之源本論病名之形軫題記品録詳覽施用）

本草經卷中（玉石草木三品）

本草經卷下（蟲獸果菜米食三品有名未用三品）

右三卷其中下二卷藥合七百三十種各別有目録並

朱墨雜書并子注今大書分為七卷

唐本注 漢書藝文志有黃帝內外經班固論云經方者本草石之寒溫原疾病之深淺乃班固論經方之語而無本草之名惟梁七錄有神農本草三卷陶據此以別錄加之為七卷序云三品混糅冷熱舛錯草石不分蟲獸無辨豈使草木同品蟲獸共條披覽既難圖繪非易今以序為一卷例為一卷玉石三品為三卷草三品為六卷木三品為三卷禽獸為一卷蟲魚為一卷果為一卷菜為一卷米穀為一卷有名未用為一卷合二十卷其十八卷中藥合八百五十種三百六十一種本經一百八十一種別錄一百一十五種新附一百九十三種有名未用

上藥一百二十種為君主養命以應天無毒多服久服不傷人欲輕身益氣不老延年者本上經

中藥一百二十種為臣主養性以應人無毒有毒斟酌其宜欲遏病補虛羸者本中經

下藥一百二十五種為佐使主治病以應地多毒不可久服欲除寒熱邪氣破積聚愈疾者本下經

三品合三百六十五種法三百六十五度一度應一日以成一歲倍其數合七百三十名也臣禹錫等謹按本草列神農本經以朱書名醫別錄以墨書神農本經藥三百六十五種今此言倍其數合七百三十名是併名醫別錄副品而言也則此一節別錄之文也當作墨書矣蓋傳寫浸久朱墨錯亂之所致耳遂令後世覽之者捃摭此類以謂非神農之書乃後人附託之文者率以此故也

右本說如此今按上品藥性亦皆能遣疾但其勢力和厚不爲倉卒之效然而歲月常服必獲大益病既愈矣命亦兼申天道仁育故云應天一百二十種者當謂寅卯辰巳之月法萬物生榮時也中品藥性療病之辭漸深輕身之說稍薄於服之者祛患當速而延齡爲緩人懷性情故云應人一百二十種者當謂午未申酉之月法萬物成熟時也

下品藥性專主攻擊毒烈之氣傾損中和不可常服疾愈即止地體收殺故云應地一百二十五種者當謂戊亥子丑之月法萬物枯藏時也兼以閏之盈數加之凡合和之體不必偏用之自隨人患參而共行但君臣配隸依後所說若單服之者所不論爾

藥有君臣佐使以相宣攝合和宜用一君二臣三佐五使又可一君三臣九佐使也

右本說如此今按用藥猶如立人之制若多君少臣多臣少佐則氣力不周也而檢仙經世俗諸方亦不必皆爾大底養命之藥則多君養性之藥則多臣療病之藥則多佐猶依本性所主而兼復斟酌詳用此者益當為

善又恐上品君中復各有貴賤譬如列國諸侯雖並得稱制而猶歸宗周臣佐之中亦當如此所以門冬遠志別有君臣甘草國老大黃將軍明其優劣皆不同秩自非農歧之徒孰敢詮正應領略輕重爲其分劑也

藥有陰陽配合 臣禹錫等謹按蜀本注云凡天地萬物皆有陰陽大小各有色類尋究其理並有法象故毛羽之類皆生於陽而屬於陰鱗介之類皆生於陰而屬於陽所以空青法木故色青而主肝丹砂法火故色赤而主心雲母法金故色白而主肺雌黃法土故色黃而主脾磁石法水故色黑而主腎餘皆以此推之例可知也 **子母兄弟** 臣禹錫等謹按蜀本注云若榆皮爲母厚朴爲子之類是也 **根莖花實草石骨肉有單行者有相須者有相使者有相畏者有相惡者有相反者有相殺者凡此七情合和時視之當用相須相使者良勿用相惡相反者若有毒宜制可用相畏相殺者不爾勿合用也** 臣禹錫等謹按蜀本注云凡三百六十五種有單行者七十一種[illegible]

須者十二種相使者九十種相畏者七十八種相惡者六十種相反者十八種相殺者三十六種凡此七情合和視之

右本說如此今按其主療雖同而性理不和更以成患今檢舊方用藥亦有相惡相反者服之乃不爲害或能有制持之者猶如寇賈輔漢程周佐吳大體既正不得以私情爲害雖爾恐不如不用今仙方甘草丸有防已細辛俗方玉石散用栝樓乾薑略舉大體如此其餘復有數十條別注在後半夏有毒用之必須生薑此是取其所畏以相制爾其相須相使者不必同類猶如和羹調食魚肉葱豉各有所宜共相宣發也

藥有酸鹹甘苦辛五味又有寒熱溫涼四氣及有毒無毒陰乾暴乾採造時月生熟土地所出眞僞陳新並各

有法

右本說如此又有分劑秤兩輕重多少皆須甄別若用得其宜與病相會入口必愈身安壽延若冷熱乖衷眞假非類分兩違舛湯丸失度當差反劇以至殞命醫者意也古之所謂良醫者蓋善以意量得其節也諺云俗無良醫枉死者半拙醫療病不如不療喻如宰夫以鱓（音善）鼈爲蓴羹食之更足成病豈充飢之可望乎故仲景云如此死者愚醫殺之也

藥性有宜丸者宜散者宜水煑者宜酒漬者宜膏煎者亦有一物兼宜者亦有不可入湯酒者並隨藥性不得違越

右本說如此又按病有宜服丸者服散者服湯者服酒者服膏煎者亦兼參用察病之源以爲其制也

欲療病先察其源先候病機五藏未虛六腑未竭血脈未亂精神未散服藥必活若病已成可得半愈病勢已過命將難全

右本說如此按今自非明醫聽聲察色至乎診脉孰能知未病之病乎且未病之人亦無肯自療故桓侯怠於皮膚之微以致骨髓之痼今非但識悟之爲難亦乃信受之弗易倉公有言曰病不肯服藥一死也信巫不信醫二死也輕身薄命不能將謹三死也夫病之所由來雖多端而皆關於邪邪者不正之因謂非人身之常理

風寒暑濕飢飽勞逸皆各是邪非獨鬼氣疫癘者矣人生氣中如魚在水水濁則魚瘦氣昏則人病邪氣之傷人最爲深重經絡既受此氣傳入藏腑藏腑隨其虛實冷熱結以成病病又相生故流變遂廣精神者本宅身以爲用身既受邪精神亦亂神既亂矣則鬼靈斯入鬼力漸強神守稍弱豈得不致於死乎古人譬之植楊斯理當矣但病亦別有先從鬼神來者則宜以祈禱祛之雖曰可祛猶因藥療致益昔李子豫有赤丸之例是也其藥療無益者是則不可祛晉景公膏肓之例是也大都鬼神之害則多端疾病之源惟一種蓋有輕重者爾真誥中有言曰常不能慎事上者自致百痾之本而怨

各於神靈乎當風卧濕反責他人於失覆皆擬人也夫
謹事上者謂舉動之事必皆謹思若飲食恣情陰陽不
節最爲百病之本致使虛損內起風濕外侵所以共成
其害如此者豈得關於神明乎惟當勤於藥術療理爾

若用毒藥療病先起如黍粟病去即止不去倍之不去十之取去爲度

右本說如此按今藥中單行一兩種有毒物只如巴豆
甘遂之輩不可便令至劑爾如經所言一物一毒服一
丸如細麻二物一毒服二丸如大麻三物一毒服三丸
如胡豆四物一毒服四丸如小豆五物一毒服五丸如
大豆六物一毒服六丸如梧子從此至十皆如梧子以

數爲丸而毒中又有輕重且如狼毒鈎吻豈同附子芫花輩邪凡此之類皆須量宜也〔臣禹錫等謹按唐本舊云三物一毒服三丸如小豆四物一毒服四丸如大豆五物一毒服五丸如兎矢注云謹按兎矢大於梧子等差不類今以胡豆替小豆小豆替大豆大豆替兎矢以爲折衷〕

療寒以熱藥療熱以寒藥飲食不消以吐下藥鬼疰蠱毒以毒藥癰腫瘡瘤以瘡藥風濕以風濕藥各隨其所宜

右本說如此又按藥性一物兼主十餘病者取其偏長爲本復應觀人之虛實補瀉男女老少苦樂榮悴鄉壤風俗並各不同褚澄療寡婦尼僧異乎妻妾此是達其性懷之所致也

病在胷膈以上者先食後服藥病在心腹以下者先服藥而後食病在四肢血脉者宜空腹而在旦病在骨髓

者宜飽滿而在夜

右本說如此按其非但藥性之多方其節適早晚復須條理今方家所云先食後食蓋此義也又有須酒服者飲服者冷服者煖服者服湯則有疎有數煮湯則有生有熟各有法用並宜審詳爾

夫大病之主有中風傷寒寒熱溫瘧中惡霍亂大腹水腫腸澼下痢大小便不通賁豘上氣欬逆嘔吐黃疸消渴留飲癖食堅積癥瘕驚邪癲癇鬼疰喉痺齒痛耳聾目盲金瘡踒烏卧切折癰腫惡瘡痔瘻癭瘤男子五勞七傷虛乏羸瘦女子帶下崩中血閉陰蝕蟲蛇蠱毒所傷此大略宗兆其間變動枝葉各宜依端緒以取之

右本說如此按今藥之所主止說病之一名假令中風乃有數十種傷寒證候亦有二十餘條更復就中求其類例大體歸其始終以本性爲根宗然後配合諸證以合藥爾病之變狀不可一槩言之所以醫方千卷猶未盡其理春秋已前及和緩之書蔑聞而道經略載扁鵲數法其用藥猶是本草家意至漢淳于意及華佗等方今時有存者亦皆條理藥性惟張仲景一部最爲衆方之祖又悉依本草但其善診脉明氣候以意消息之爾至於刳腸剖臆刮骨續筋之法乃别術所得非神農家事自晉代已來有張苗宮泰劉德史脫靳邵趙泉李子豫等一代良醫其貴勝阮德如張茂先輩逸民皇甫士

安及江左葛洪蔡謨商仲堪諸名人等並研精藥術宋有羊欣元徽胡洽秦承祖齊有尚書褚澄徐文伯嗣伯羣從兄弟療病亦十愈其八九凡此諸人各有所撰用方觀其指趣莫非本草者乎或時用別藥亦循其性度非相踰越范汪方百餘卷及葛洪肘後其中有細碎單行經用者或田舍試驗之法或殊域異識之術如藕皮散血起自庖人牽牛逐水近出野老餅店蒜虀乃是下蛇之藥路邊地菘而爲金瘡所秘此蓋天地間物莫不爲天地間用觸遇則會非其主對矣顔光祿亦云詮三品藥性以本草爲主道經仙方服食斷穀延年却老乃至飛丹鍊石之奇雲騰羽化之妙莫不以藥道爲先用

藥之理一同本草但制御之途小異世法猶如粱肉三
於濟命華夷禽獸皆其所資其爲主理即同其爲性靈
則異爾大略所用不多遠至二十餘物或單行數種便
致大益是其服食歲月深積即本草所云久服之效不
如俗人微覺便止故能臻其所極以致遐齡豈但充體
愈疾而已哉今庸醫處療皆恥看本草或倚約舊方或
聞人傳說或遇其所憶便攬筆疏之俄然戴面以此表
奇其畏惡相反故自寡昧而藥類違僻分兩參差亦不
以爲疑脫或偶爾值差則自信方驗若旬月未瘳則言
病源深結了不反求諸己詳思得失虛搆聲稱多納金
帛非惟在顯宜責固將居幽貽譴矣其五經四部軍國

禮服若詳用乘越者猶可矣止於事迹非宜爾至於湯藥一物有誤便性命及之千乘之君百金之長何不深思戒謹邪昔許太子侍藥不嘗招弑君之惡季孫饋藥仲尼有未達之辭知其藥性之不可輕信也晉時有一才人欲刋正周易及諸藥方先與祖訥共論祖云辨釋經典縱有異同不足以傷風教至於湯藥小小不達便致壽夭所由則後人受弊不少何可輕以裁斷祖之此言可為仁識足為龜鏡矣按論語云人而無常不可以作巫醫明此二法不可以權飾妄造所以醫不三世不服其藥九折臂者乃成良醫蓋謂學功須深故也復患今之承藉者多恃衒名價亦不能精心研習實為可惜

虛傳聲美聞風競往自有新學該明而名稱未播貴勝以爲始習多不信用委命虛名諒可惜也京邑諸人皆尚聲譽不取實事余祖世已來務敦方藥本有范汪方一部斟酌詳用多獲其效內護家門傍及親族其有虛心告請者不限貴賤皆摩踵救之凡所救活數百千人自余投纓宅嶺猶不忘此日夜翫味常覺欣欣今亦撰方三卷并效驗方五卷又補葛氏肘後方三卷蓋欲承嗣善業令諸子姪不敢失墜可以輔身濟物者也

今按諸藥採造之法旣並用見成非能自採不復具論其事惟合藥須解節度列之如左

按諸藥所生皆的有境界秦漢已前當言列國今郡縣

之名後人所改爾江東已來小小雜藥多出近道氣力性理不及本邦假令荊益不通則全用歷陽當歸錢塘三建豈得相似所以療病不及往人亦當緣此故也蜀藥及北藥雖有去來亦非復精者且市人不解藥性惟尚形飾上黨人參世不復售華陰細辛棄之如芥且各隨俗相競不能多備諸族故往往遺漏今之所存二百許種爾衆醫都不識藥惟聽市人市人又不辨究皆委採送之家採送之家傳習造作真偽好惡並皆莫測所以鍾乳醋煮令白細辛水漬使直黃耆蜜蒸爲甜當歸酒灑取潤螵蛸膠著桑枝蜈蚣朱足令赤諸有此等皆非事實俗用既久轉以成法非復可改末如之何又依

方分藥不量剝除只如遠志牡丹纔不收半地黃門冬
三分耗一凡去皮除心之屬分兩皆不復相應病家惟
依此用不知更秤取足又王公貴人勝合藥之日悉付羣
下其中好藥貴石無不竊換乃有紫石英丹砂吞出洗
取一片動經十數過賣諸有此例巧僞百端雖復監檢
終不能覺以此療病固難即效如斯並是藥家之盈虛
不得咎醫人之淺拙也
凡採藥時月皆是建寅歲首則從漢太初後所記也其
根物多以二月八月採者謂春初津潤始萌未衝枝葉
勢力淳濃故也至秋枝葉乾枯津潤歸流於下今即事
驗之春寧宜早秋寧宜晚華實莖葉乃各隨其成熟爾

五·四十フ

歲月亦有早晏不必都依本文也

經說陰乾者謂就六甲陰中乾之又依遁甲法甲子旬陰中在癸酉以藥著酉地也實謂不必然正是不露日暴於陰影處乾之爾所以亦有云暴乾故也若幸可兩用益當爲善【今按】本草採藥陰乾者皆多惡至如鹿茸經稱陰乾皆悉爛令壞今火乾易得且良草木根苗陰之皆惡九月已前採者悉宜日乾十月已後採者陰乾乃好

古秤惟有銖兩而無分名今則以十黍爲一銖六銖爲一分四分成一兩十六兩爲一斤雖有子穀秬黍之制從來均之已久正爾依此用之【臣禹錫等謹按】唐本又云但古秤皆復今南秤是也晉秤始後漢末已來分一斤爲二斤一兩爲二兩耳金銀絲綿並與藥同無輕重矣古方惟有仲景而已涉今秤若用古秤作湯則水爲殊少故知非復秤悉用今者耳

今方家所云等分者非分兩之分謂諸藥斤兩多少皆同爾先視病之大小輕重所須乃以意

裁之

凡此之類皆是丸散丸散竟依節度用之湯酒之中無等分也

凡散藥有云刀圭者十分方寸匕之一准如梧桐子大也方寸匕者作匕正方一寸抄散取不落爲度錢五匕者今五銖錢邊五字者以抄之亦令不落爲度一撮者四刀圭也十撮爲一勺十勺爲一合以藥升分之者謂藥有虛實輕重不得用斤兩則以升平之藥升方作上徑一寸下徑六分深八分內散藥勿按抑之正爾微動令平調爾今人分藥不復用此

凡丸藥有云如細麻者即胡麻也不必扁扁但令較略

大小相稱爾如黍粟亦然以十六黍爲一大豆也如大麻子者准三細麻也如胡豆者即今青斑豆是也以二大麻子准之如小豆者今赤小豆也粒有大小以三大麻子准之如大豆者以二小豆准之如梧子者以二大豆准之一方寸匕散蜜和得如梧子准十丸爲度如彈丸及雞子黃者以十梧子准之唐本注云方寸匕散爲丸如梧子得十六丸如彈丸一枚若雞子黃者准四十丸今彈丸同雞子黃此甚不等

凡湯酒膏藥舊方皆云㕮方汝切咀子與切者謂秤畢擣之如大豆又使吹去細末此於事殊不允當藥有易碎難碎多末少末秤兩則不復均平今皆細切之較略令如㕮咀者乃得無末而片粒調和也唐本注云㕮咀正謂商量斟酌之餘解皆理外生情爾臣

愚錫等看詳㕮咀即上文細切之義非商量斟酌也

凡丸散藥亦先切細暴燥乃擣之有各擣者有合擣者並隨方所言其潤濕藥如天門冬乾地黃輩皆先切暴獨擣令偏碎更出細擘暴乾若逢陰雨亦以微火烘(火工切)之既燥小停冷乃擣之

凡濕藥燥皆大耗當先增分兩須得屑乃秤之為正其湯酒中不須如此也

凡篩丸藥用重密絹令細於蜜丸易熟若篩散草藥用輕踈絹於酒中服即不泥其石藥亦用細絹篩令如丸者

凡篩丸散藥畢皆更合於臼中以杵擣之數百過視其色理和同為佳也

凡湯酒膏中用諸石皆細擣之如粟米亦可以葛布篩令調並以新綿別裹內中其雄黃朱砂輩細末如粉

凡煑湯欲微火令小沸其水數依方多少大略二十兩藥用水一斗煑取四升以此為準然則利湯欲生少水而多取汁補湯欲熟多水而少取汁好詳視之不得令水多少用新布兩人以尺木絞之澄去垽魚靳切濁紙覆令密溫湯勿令鎗器中有水氣於熱湯上煑令煖亦好服湯寧令小沸熱易下冷則嘔涌

凡云分再服三服者要令勢力相及并視人之強羸病之輕重以為進退增減之不必悉依方說也

凡漬藥酒皆須細切生絹袋盛之乃入酒密封隨寒暑

日數視其濃烈便可漉出不必待至酒盡也滓可暴燥微擣更漬飲之亦可散服

凡建中腎瀝諸補湯滓合兩劑加水煮竭飲之亦敵一劑新藥貧人可當依此用皆應先暴令燥

凡合膏初以苦酒漬令淹浹不用多汁密覆勿洩云晬祖對切時者周時也從今旦至明旦亦有止一宿者煮膏當三上三下以洩其熱勢令藥味得出上之使帀帀沸乃下之使沸靜良久乃止寧欲小小生其中有薤白者以兩頭微焦黃爲候有白芷附子者亦令小黃色爲度豬肪皆勿令經水臘月者彌佳絞膏亦以新布絞之若是可服之膏膏滓亦可酒煮飲之可摩之膏膏滓則宜

以傳病上此蓋欲兼盡其藥力故也

凡膏中有雄黃朱砂輩皆別擣細研如麪須絞膏畢乃投中以物疾攪至于凝強勿使沉聚在下不調也有水銀者於凝膏中研令消散胡粉亦爾

凡湯酒中用大黃不須細剉作湯者先以水浸令淹浹密覆一宿明旦煑湯臨熟乃內湯中又煑兩三沸便絞出則勢力猛易得快利丸散中用大黃舊皆蒸之今不須爾

凡湯中用麻黃皆先別煑兩三沸掠去其沫更益水如本數乃內餘藥不爾令人煩麻黃皆折去節令理通寸剉之小草瞿麥五分剉之細辛白芷削三分剉之丸散膏

中則細剉也
凡湯中用完物皆擘破乾棗梔子括樓之類是也用細核物亦打破山茱萸五味子蕤核決明子之類是也細花子物正爾完用之旋復花菊花地膚子葵子之類是也米麥豆輩亦完用之諸蟲先微熬之惟螵蛸當中破炙之生薑射干皆薄切之芒消飴糖阿膠皆須絞湯畢內汁中更上火兩三沸烊盡乃服之
凡用麥門冬皆微潤抽去心杏人桃人湯柔撻去皮巴豆打破剝其皮刮去心不爾令人悶石韋刮去毛辛夷去毛及心鬼箭削取羽皮藜蘆剔取根微炙枳實去其瓤亦炙之椒去實於鐺中微熬令汗出則有勢力礬石

於瓦上若鐵物中熬令沸汁盡即止礬石皆以黃土泥包使燥燒之半日令熟而解散犀角羚羊角皆鎊刮作屑諸齒骨並炙擣碎之皂莢去皮子炙之

凡湯并丸散用天雄附子烏頭烏喙側子皆煻灰中炮令微坼削去黑皮乃秤之惟薑附湯及膏酒中生用亦削皮乃秤之直理破作七八片隨其大小但削除外黑尖處令盡

凡湯酒丸散膏中用半夏皆且完用熱湯洗去上滑以手挼之皮釋隨剝去更復易湯洗令滑盡不爾戟人咽喉舊方云二十許過今六七過便足亦可煮之一兩沸一易水如此三四過仍挼洗畢便暴乾隨其大小破為

細片乃秤之以入湯若膏酒丸散皆須暴燥乃秤之
凡丸散用阿膠皆先炙使通體沸起燥乃可擣有不沸
處更炙之
凡丸中用蠟皆烊投少蜜中攪調以和藥若用熟艾先
細擘合諸藥擣令散不可篩者別擣內散中和之
凡用蜜皆先火煎掠去其沫令色微黃則丸經久不壞
掠之多少隨蜜精麤
凡丸散用巴豆去皮心膜杏人桃人葶藶胡麻諸有膏膩藥皆先
熬黃黑別擣令如膏指擳莫結切視泯泯爾乃以向成散
稍稍下臼中合研擣令消散仍復都以輕疎絹篩度之
須盡又內臼中依法擣數百杵也湯膏中用亦有熬之

者雖生並擣破之

凡用桂心厚朴杜仲秦皮木蘭之輩皆削去上虛軟甲錯處取裏有味者秤之茯苓豬苓削除黒皮牡丹巴戟天遠志野葛等皆搥破去心紫菀洗去土皆畢乃秤之薤白葱白除青令盡莽草石南茵芋澤蘭皆剔取葉及嫩莖去大枝鬼臼黄連皆除根毛蜀椒去閉口者及目熬之

凡狼毒枳實橘皮半夏麻黄吳茱萸皆欲得陳久者良其餘惟須精新也

凡方云巴豆若干枚者粒有大小當先去心皮乃秤之以一分准十六枚附子烏頭若干枚者去皮畢以半兩

准一枚枳實若干枚者去穰畢以一分准二枚橘皮一
分准三枚棗有大小三枚准一兩云乾薑一累者以重
一兩爲正
凡方云半夏一升者洗畢秤五兩爲正蜀椒一升者三
兩爲正吳茱萸一升者五兩爲正菟絲子一升九兩爲
正菴䕡子一升四兩爲正蛇牀子一升三兩半爲正地
膚子一升四兩爲正此其不同也云某子一升者其子
各有虛實輕重不可通以秤准皆取平升爲正
凡方云用桂一尺者削去皮畢重半兩爲正甘草一尺
者重二兩爲正云某草一束者以重三兩爲正云一把
者重二兩爲正云蜜一斤者有七合豬膏一斤者有一

外二合也

右合藥分劑料理法

臣禹錫等謹按徐之才藥對孫思邈千金方陳藏器本草拾遺序例如後

夫衆病積聚皆起於虛也虛生百病積者五藏之所積聚者六腑之所聚如斯等疾多從舊方不假增損虛而勞者其弊萬端宜應隨病增減古之善爲醫者皆自採藥審其體性所主取其時節早晚早則藥勢未成晚則盛勢已歇今之爲醫不自採藥且不委節氣早晚又不知冷熱消息分兩多少徒有療病之名永無必愈之效此實浮惑聊復審其冷熱記增損之主爾虛勞而頭痛

復熱加枸杞萎蕤虛而欲吐加人參虛而不安亦加人參虛而多夢紛紜加龍骨虛而多熱加地黃牡蠣地膚子甘草虛而冷加當歸芎藭乾薑虛而損加鍾乳棘刺蓯蓉巴戟天虛而大熱加黃芩天門冬虛而多忘加茯神遠志虛而驚悸不安加龍齒沙參紫石英小草若冷則用紫石英小草若客熱即用沙參龍齒不冷不熱皆用之虛而口乾加麥門冬知母虛而吸吸加胡麻覆盆子柏子人虛而多氣兼微欬加五味子大棗虛而身強腰中不利加磁石杜仲虛而多冷加桂心吳茱萸附子烏頭虛而勞小便赤加黃芩虛而客熱加地骨皮白水黃耆白水地名虛而冷用隴西黃耆虛而痰復有氣用生薑

半夏枳實虛而小腸利加桑螵蛸龍骨雞肶胵虛而小腸不利加茯苓澤瀉虛而損溺白加厚朴諸藥無有一一歷而用之但據體性冷熱的相主對聊叙增損之一隅夫處方者宜准此

凡諸藥子人皆去皮尖及雙人者仍切之凡烏梅皆去核入丸散熬之大棗擘去核凡用麥糵麴大豆黃卷澤蘭蕪荑殭蠶乾漆蜂房皆微炒

凡湯中用麝香犀角鹿角羚羊角牛黃蒲黃丹砂須熟末如粉臨服内湯中攪令調和服之

凡茯苓芍藥補藥須白者瀉藥惟赤者

凡石蟹皆以槌極打令碎乃入臼不爾擣不可熟牛膝

石斛等入湯酒拍碎用之

凡菟絲子煖湯淘汰去沙土乾漉煖酒漬經一宿漉出暴微白擣之不盡者更以酒漬經三五日乃出更曬微乾擣之須臾悉盡極易碎

凡斑猫等諸蟲皆去足翅微熬唯牡蠣熬令黃

凡諸湯用酒者皆臨熟下之

凡用銀屑以水銀和成泥

凡用鍾乳等諸石以玉槌水研三日三夜漂鍊務令極細

藥有宣通補洩輕重澀滑燥濕此十種者是藥之大體而本經都不言之後人亦所未述遂令調合湯丸有昧於此者至如宣可去壅即薑橘之屬是也通可去滯即

通草防已之屬是也補可去弱即人參羊肉之屬是也
洩可去閉即葶藶大黃之屬是也輕可去實即麻黃葛
根之屬是也重可去怯即磁石鐵粉之屬是也澀可去
脫即牡蠣龍骨之屬是也滑可去着即冬葵榆皮之屬
是也燥可去濕即桑白皮赤小豆之屬是也濕可去枯
即紫石英白石英之屬是也只如此體皆有所屬凡用
藥者審而詳之則靡所遺失矣

凡五方之氣俱能損人人生其中即隨氣受疾雖習成
其性亦各有所資乃天生萬物以與人亦人窮急以致
物今嶺南多毒足解毒藥之物即金蛇白藥之屬是也
江湖多氣足破氣之物即薑橘吳茱萸之屬是也寒溫

不節足療溫之藥即柴胡麻黃之屬是也涼氣多風足
理風之物即防風獨活之屬是也濕氣多痺足主痺之
物即魚鼈螺蜆之屬是也陰氣多血足主血之物即地
錦石血之屬是也嶺氣多瘴足主瘴之物即常山鹽麩
涪醋之屬是也石氣多毒足主毒之物即犀角麝香羚
羊角之屬是也水氣多痢足主痢之物即黃連黃蘗之
屬是也野氣多蠱足主蠱之物即蘘荷茜根之屬是也
沙氣多狐足主短狐之物即鸀鳿鸂鶒之屬是也大略
如此各隨所生中央氣交兼有諸病故醫人之療亦隨
方之能若易地而居即致乖舛矣故古方或多補養或
多導洩或衆味或單行補養即去風導洩即去氣衆味

則貴要單行乃貧下豈前賢之偏有所好或復用不遂其宜耳

重廣補注神農本草并圖經序

良醫之不能以無藥愈疾猶良將不能以無兵勝敵也兵之形易見善用者能以其所以殺者生人藥之性難窮不善用者返以其所以生者殺人吁可畏哉寒熱溫凉辛甘緩急品類萬殊非一日而七十毒者孰能辨之彼玉函金匱肘後囊中千金之所傳外臺之所祕其為方不知其幾何由是言之則非獨察脉用方之為難而辨藥審其難者金石之珍草木之性飛潛動植之廣且衆也風氣不同南北不通或非中國之所有或人力之

所不可到乃欲眞僞無誑於指掌之間則本草圖經二
者何可須臾離也世所傳曰神農氏本草三卷梁陶隱
居離以爲七卷唐蘇恭李勣之徒又附益爲二十卷別圖
藥形以爲經其書略備矣開寶中
太祖皇帝命盧多遜等考驗得失增藥尤多號爲開寶
本草
仁宗皇帝嘉祐初又使掌禹錫林億蘇頌張洞爲之補
注因唐圖經別爲繪畫復增藥者千有餘種於是收拾
遺逸訂正訛謬刊在有司布之天下其爲壽養生人之
術無一不具然世之醫者率故守陋妄意穿鑿撰數湯
劑幸而數中自謂足以療[illegible]之病詰其論說則漠然

不知顧本草與圖經之學矣況窮僻州下邑雖有願見
者何所售之閬中陳氏子承少好學尤喜於醫該通諸
家之說嘗患二書傳者不博而學者不兼有也乃合爲
一又附以古今論說與已所見聞列爲二十三卷名曰
重廣補注神農本草并圖經書具著其說圖見其形一啓
秩而兩得之不待至乎殊方絕域山巔水涯而品類萬
殊者森森在目前譬夫談輿地者觀於職方閱戰具者之
入武庫也承之先世爲將相歐陽子所謂四世六公者
承其曾孫少孤奉其母江淮間閉門蔬食以爲養君子
稱其孝間有奇疾衆醫睽貽不知所出承徐察其脉曰
當投某劑某刻良愈無不然者然則承之學雖出於圖

書而精識超絶茲二者又安能域之哉鬼臾區岐伯遠矣吾不得而知也其視秦越人淳于意公華它輩爲何如識者當能知之元祐七年四月朔左朝請大夫充天章閣待制知杭州軍州事兼管内勸農使充兩浙西路兵馬鈐轄兼提舉本路兵馬巡檢公事上輕車都尉賜紫金魚袋長樂林希序

雷公炮炙論序

若夫世人使藥豈知自有君臣既辨君臣寧分相制祇如栨毛（今鹽草也）霑溺立銷斑腫之毒象膽揮黏乃知藥有情異鱓魚插樹立便乾枯用狗塗之（以犬膽灌之插魚處立如故也）却當榮盛無名（無名異形似玉柳石又如石灰味別）止楚截指而似去甲毛聖石開

盲明目而如雲離日當歸止血破血頭尾效各不同（頭止血尾破血）蕤子熟生足睡不眠立據弊箄淡鹵（常使者甑中箄能淡鹽味）如酒霑交（今蜜枳繳枝又云交加枝）鐵遇神砂如泥似粉石經鶴糞化作塵飛見橘花似髓斷絃折劍遇鸞血而如初（以鸞血煉作膠粘折處鐵物永不斷）海竭江枯投游波（燕子是也）而立泛令鉛拒火須仗修天（今呼為補天石）如要形堅豈忘紫背（有紫背天葵如常食葵菜祇有背紫面青能堅鉛形）留砒住鼎全賴宗心（別有宗心草今呼石竹不是食者粳必恐誤其草出欻州生處多出獸）雌得芹花（其草名為立起其形如芍藥花色青可長三尺已來葉上黃班色味苦澁堪用煮雌黃立住火）立便成庚硇遇赤鬚（其草名赤鬚今呼為虎鬚草是用煮硇砂即生火驗）水留金鼎水中生火非猾髓而莫能（海中有獸名曰猾以髓入在油中其油沾水水中火生不可救之用酒噴之即涎勿於屋下收）長齒生牙賴雄鼠之骨末（其齒若折年多不生者取雄鼠脊骨作末揩折處齒立生如故）髮眉墮落塗半夏而立生

髮墮落者以生半夏莖揀之取汁塗髮落處立生目辟眼瞻有五花而自正五加皮是也其葉有雄雌三葉為雄五葉為雌須使五葉者作末酒浸以之其目瞻者正脚生肉杖裩繫菪根脚有肉杖者取莨菪根於裩帶上繫之表感瘥永痊囊皺旋多夜煎竹木多小便者夜煎萆薢一件服之永不夜起也體寒腹大全賴鸕鷀若患腹大如鼓米飲調鸕鷀末服立枯如故也血泛經過飲調瓜子甜瓜子內仁擣作末去油飲調服之立絕咳逆數數酒服熟雄天雄炮過以酒調一錢匕服立定也遍體瘮風冷調生側附子傍生者曰側子作末冷酒服立差也腸虛泄痢須假草零擣五倍子作末為熟水下之立止也久渴心煩宜投竹瀝除癥去塊全仗硝硇硝硇即硇砂硝石二味於乳鉢中研作粉同鍜了酒服神效也益食加觴須煎蘆朴不食者并飲酒少者煎逆水蘆根并厚朴二味湯服強筋健骨酒是蓯鱓蓯蓉并鱓魚二味作末以黃精酒丸服之可力倍常十也出乾寧記宰駐色延年精蒸神錦出顏色服黃精自然汁拌細研神錦於柳木甑中蒸七日了以木蜜丸服顏皃可如初女之容色也知瘡所在口點陰膠陰膠即是甑中氣垢少許於口中即知藏府所起直徹至住處知痛足可

醫也 產後肌浮甘皮酒服（產後肌浮酒服甘皮立枯）口瘡舌坼立愈黃蘗（口瘡舌坼以根黃塗蘇炙作末塗之立差）腦痛欲亡鼻投硝末（頭痛者以硝石作末內鼻中立止）心痛欲死速覓延胡（以延胡索作散酒服之立愈也）如斯百種是藥之功某忝遇明時謬看醫理雖尋聖法難可窮微略陳藥食之功能豈溺仙人之要術其制藥炮熬煮炙不能記年月哉欲審元由須看海集某不量短見直錄炮熬煮炙列藥制方分為上中下三卷有三百件名具陳于後

凡方云丸如細麻子許者取重四兩鯉魚目比之

云如大麻子許者取重六兩鯉魚目比之

云如小豆許者取重八兩鯉魚目比之

云如大豆許者取重十兩鯉魚目比之

云如兎葦俗云兎屎許者取重十二兩鯉魚目比之

云如梧桐子許者取重十四兩鯉魚目比之

云如彈子許者取重十六兩鯉魚目比之

一十五箇白珠爲準是一彈丸也

凡方中云以水一溢至三溢至十溢者每溢秤之

重十二兩爲度

凡云一兩一分一銖者正用今絲綿秤也勿得將

四銖爲一分有誤必所損兼傷藥力

凡云散秪作散丸秪作丸或酒煮或用醋或乳煎

不得遺法

凡方煉蜜每一斤秪煉得十二兩半或一分是數

若火少若火過並用不得也
凡膏煎中用脂先須煉去草膜了方可用也
凡修事諸藥物等一一並須令專心勿令交雜使
用或先熬後煮或先煮後熬不得改移一依
法則也
凡修合丸藥用蜜秖用蜜用餳秖用餳用糖秖用
糖勿交雜用必宣瀉人也

經史證類備急本草卷第一